

## CO2レーザー同意書

### □レーザーの効果

CO2(炭酸ガス)レーザーは、水にエネルギーが吸収されて、水分のある組織を蒸散させます。細かい皮膚の隆起に対し、削ることで平らにしていきます。除去後の傷を最小限にするため、深さは真皮浅層までに行っています。そのため、1回ではとぎれないことがあります。

### □レーザーの手順と経過

1. レーザーを照射します。チクチクする痛みです。痛みに弱い方は麻酔のシール（¥95 税別）をお渡しします。
2. 直後；照射部分はやや陥凹し、周囲は炎症で赤くなります。
3. 翌日；薄いかさぶたになります。
4. 1～2週間後；かさぶたが剥がれ、皮膚が薄いためやや凹んで、ピンク色になります。  
\*かさぶたが剥がれたら皮膚の状態を確認しますので、約2週間後に予約をとります。
5. 1～2ヶ月後；その後人によって、炎症後の色素沈着が生じる場合がありますが、徐々に消えていきます。  
人によっては、6ヶ月くらいかかる場合があります。
6. 傷の状態；目立たなくなるまで、6ヶ月くらいかかります。

### □レーザー後の処置

かさぶたが取れるまで；細菌感染を予防するため抗生剤軟膏（¥560 税別）を塗ります。

### □残存している場合の再照射

1ヶ月以上間隔をあけて、再照射します。

### □再発の可能性について

時間とともに自然に発生するもの、ウイルス性のものなどあり、いずれも再発する可能性があります。

### □料金 税別

- 5個以下まで； ¥3,000
- 10個以下まで； ¥5,800
- 15個以下まで； ¥8,600
- 20個以下まで； ¥11,400

何か気になる事がありましたら、すぐに再診して下さい。当クリニックの診療時間外の場合は、お近くの救急外来に電話をかけ、受診して下さい。

上記に内容について、同意します。

日付；                    年                    月                    日

ご署名；