

美白剤の同意書

ハイドロキノン 8% 5g (¥ 3,250 税別)

- ◆作用機序；メラニン色素の生成抑制、およびメラノサイト細胞活性抑制。
- ◆注意事項；日光でかぶれる可能性がありますので、抗炎症作用のあるフタキシリーズの日焼け止め (5ml ¥ 835 / 35ml ¥ 4,430 税別) の外用が必要です。

レチノイン酸 0.1% 5g (¥ 3,250 税別)

- ◆作用機序；
①表皮の細胞分裂を促進し、色のついた細胞を排出します。
②加齢によって菲薄化した表皮が、細胞分裂によって厚みが回復してきます。
③角層が薄くなり、肌がつるつるしてきます。
- ◆注意事項； 外用後2、3日で、副反応 (カサカサ、かゆみ、赤み、ヒリヒリ、痛み等) が出現します。これは、かぶれではなく「正常な反応」ですので、そのまま外用を続けて下さい。1ヶ月程で治まってきます。副反応は人によって程度の差があります。小範囲から外用し、反応を見ながら拡大していくと良いです。

【保存方法】 要冷蔵で3ヶ月以内

～使用方法～

正常な肌に付着しても、極端に脱色されてしまうことはありませんので、素手で塗布できます。

朝

1. 基礎化粧品
2. シミにハイドロキノンを塗布。その上にフタキシリーズの日焼け止めを重ね塗り。
3. その後、普段通りにメイク。

夜

1. 基礎化粧品
2. シミにレチノイン酸とハイドロキノンを重ね塗り。(順番は逆でも可)

2回目以降は診察予約無しでご購入頂けますので、受付へお申し付け下さい。

上記に内容について、同意します。

日付； 年 月 日

ご署名；