

## ボトックス(Botulax)同意書

### □ボトックスによる発汗の抑制

ボトックスとはボツリヌス菌から抽出した毒素で、発汗するための神経伝達物質アセチルコリンの分泌をブロックし、発汗を止めることができます。

### □方法

腋窩を保冷剤で冷やし、知覚を少し鈍らせます。左右それぞれ20～30箇所、少量ずつ注入していきます。

### □施術後の注意

特にありません。

### □効果

注射後2～3日で発汗が減少、7日程度ではっきりわかるようになります。効果はおよそ3～4ヶ月持続します。

### □繰り返しによる効果

効果が弱くなってきたら、施術後3ヶ月以上あけて繰り返し注射することができます。また、繰り返し注射する事によって、改善率が上がっていきます。

### □中和抗体について

3ヶ月以内に再投与すると、効果が減弱する中和抗体が出現する可能性があります。

### □妊娠と避妊について

妊娠中および授乳中の方；使用できません。

妊娠する可能性のある方；ボトックス投与中および最終投与後の2回の月経を経るまでは避妊するようにして下さい。

男性は、ボトックス投与中およびボトックス最終投与後の少なくとも3ヶ月は避妊するようにして下さい。

### □感染症について

Botulax含めその他ボトックス製剤はヒト由来のアルブミンを含み、その製造過程で十分な検査チェックがなされていますが、理論上クロイツフェルト・ヤコブ病その他、未知の疾患への感染の危険性をゼロにすることはできません。しかし、Botulaxと同等品のBOTOXが米国で1977年に初めて使用されて以来、そのような感染の報告は現時点では皆無です。

何か気になる事があれば、すぐに再診して下さい。当クリニックの診療時間外の場合は、お近くの救急外来に電話をかけ、受診して下さい。

上記に内容について、同意します。

日付；                   年                   月                   日

ご署名；